

Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409C

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione

c.a. Ai Direttori dei Distretti delle ASL
Ai MMG per il tramite dei Distretti delle ASL
E p.c. FIMMG
SNAMI
SMI
Loro Sedi

Oggetto: *Vaccinazione anti-pneumococcica: Indicazioni sull'applicazione della schedula sequenziale*

Come già anticipato dalle precedenti note, il vaccino pneumococcico 20-valente (PCV20) ha sostituito il vaccino pneumococcico 13-valente (PCV13) le cui scorte sono andate ad esaurirsi. Il vaccino PCV20 sostituisce a tutti gli effetti il PCV13 e deve essere somministrato solo ad adulti di età pari o superiore a 18 anni.

In attesa di aggiornamenti sulla nuova strategia vaccinale anti pneumococcica da parte del Ministero della Salute e al fine di garantire la migliore protezione possibile, le indicazioni operative a livello regionale sono di seguito descritte:

- Nei soggetti con condizioni di rischio predisponente (secondo le indicazioni nazionali/regionali) si applica la schedula sequenziale (PCV+PPV23): somministrare una prima dose di PCV20 seguita da una dose di PPV23 a distanza di almeno 6 mesi;
- Nei soggetti di 65 anni di età, in assenza di patologia o condizione di rischio predisponente (sulla base delle indicazioni nazionali/regionali) non si applica la schedula sequenziale: somministrare 1 dose di PCV20;
- Nei soggetti vaccinati con PCV13 si applica la schedula sequenziale (PCV+PPV23): somministrare una prima dose di PCV seguita da una dose di PPV23 a distanza di 6 mesi/1 anno (secondo le indicazioni regionali).

Si riporta di seguito la tabella relativa alle possibili co-somministrazioni dei vaccini in uso presso gli studi dei MMG.

È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Referente che ha predisposto la pratica

Lorenza Ferrara

Bartolomeo Griglio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Allegato: Tabella Co-somministrazioni

VACCINI	INFLUENZA Inattivato/ Alto dosaggio	INFLUENZA adiuvato	PNEUMOCOCCO 20-VALENTE	PNEUMOCOCCO 23-VALENTE	ZOSTER VIVO ATTENUATO	ZOSTER RICOMBINANTE ADIUVATO	COVID 19
INFLUENZA Inattivato/Alto dosaggio			SI	SI	SI	SI	SI
INFLUENZA adiuvato			SI	SI	SI	NO	SI
PNEUMOCOCCO 20-VALENTE	SI	SI		NO	SI	SI	SI
PNEUMOCOCCO 23-VALENTE	SI	SI	NO		SI	SI	SI
ZOSTER VIVO ATTENUATO	SI	SI	SI	SI			SI
ZOSTER RICOMBINANTE ADIUVATO	SI	NO	SI	SI			SI
COVID 19	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Si ricorda che:

- a meno di controindicazioni espressamente dichiarate in RCP, due o più vaccini inattivati possono essere co-somministrati oppure possono essere somministrati a qualsiasi intervallo temporale;
- a meno di controindicazioni espressamente dichiarate in RCP, due o più vaccini a virus vivi attenuati possono essere co-somministrati oppure devono essere somministrati con un intervallo di almeno 28 giorni;
- a meno di controindicazioni espressamente dichiarate in RCP, un vaccino inattivato e un vaccino a virus vivo attenuato possono essere co-somministrati oppure possono essere somministrati a qualsiasi intervallo temporale.
- il vaccino antinfluenzale adiuvato e il vaccino zoster ricombinante adiuvato devono essere somministrati con un intervallo di almeno 15 giorni.